
PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

ANTES DE PARAR CUALQUIER MEDICACIÓN, CONSEGUIR POR FAVOR LA APROBACIÓN DE TU MÉDICO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA.

1. Parar todo el aspirin y aspirin que contienen medicaciones, Plavix, Aggrenox y otros agentes antiplaquetarios por lo menos 5 días antes del procedimiento.
2. Parar todas las medicaciones antiinflamatorias tales como ibuprofen, naproxen, Aleve, Motrin, etc., por lo menos 48 horas antes de procedimientos. Generalmente Celebrex, Bextra o Vioxx no necesitan ser parados, sino si tienes cualesquiera preguntas, comprueban por favor con tu doctor.
3. Stop vitamina E y Ginko Biloba por lo menos 5 días antes de procedimientos.
4. Stop Coumadin por lo menos 5 días antes de procedimientos.
5. Compuestos de poco peso molecular de la heparina de la parada tales como Lovenox por lo menos 24 horas antes del procedimiento.
6. Parar toda la medicación preceptiva o herbaria de la dieta por lo menos 24 horas antes del procedimiento.
7. If eres diabético y/o tomas la medicación de la diabetes, compruebas por favor con tu doctor.

SI ESTÁS TENIENDO SEDACIÓN PARA TU PRODECURE:

1. You debe tener una impulsión del acompañamiento que te diriges después de tu procedimiento. Esta persona debe ser identificada al personal antes del comienzo del procedimiento.
2. Cedars-Sinai policy prohibits our discharging you after sedation if you are unaccompanied this includes leaving our office via cab, bus or car service.

3. No puedes tener cualquier cosa comer por 8 horas antes de tu procedimiento.
4. Nada beber incluyendo el agua, 6 horas antes del procedimiento.
 - a. Si tomas generalmente la medicación por la mañana, tomarla por favor con apenas los sorbos de agua.